

Recomendaciones a tener en cuenta

ZAFRA DE PARTOS

El 60 a 70% de las enfermedades de la vaca se generan en la transición, o sea en el periodo de 21 días preparto hasta 21 de postparto.



Una lactancia que comienza sin contratiempos es más productiva.



CLAVES DEL PARIDERO

- Cerca del tambo y con buen acceso
- Sin lugares para que la vaca se esconda a parir
- Recorrida frecuente, Idealmente cada 1 hora
- Higiénico (evite partos en el barro)
- Buen área de comedero (70 cm por vaca), acceso al agua en cantidad y calidad
- ¡Pocas horas de comedero vacío!
- De ser posible, sepáre las vaquillonas
- Sombra

INSTALACIONES Y EQUIPO DE TRABAJO

Prepárese para una correcta atención de partos y colecta higiénica del calostro. Converse y entrene a su personal de forma de enfrentar este crucial momento de manera organizada y con las mayores posibilidades de éxito. ¡Evite sorpresas y situaciones de estrés!



Materiales para atención de partos: guantes de tacto o inseminación, guantes de látex o nitrilo, lubricante (carboximetilcelulosa), desinfectante, jabón líquido, maneras o cuerdas.



Recuerde: un parto fácil y en condiciones higiénicas, un buen calostrado con calostro en cantidad y calidad, en un ambiente saludable, ayudará a la recuperación de la vaca y dan más posibilidad de sobrevivir a la ternera. ¡El futuro de su tambo!



Consulte y planifique con su médico veterinario de confianza.

Equipo Técnico: Dr. Miguel Chiarlone, Dra. Lourdes Adrien, Dr. Maximiliano Pastorini, Dr. Joaquin Barca.

Coordinación Técnica: Dr. Juan Manuel Ramos Rama



Asociación Nacional de
Productores de Leche



Facultad de Veterinaria
Universidad de la República
Uruguay



SALUD DE RUMIANTES